		Asymétrie, testicules iméguliers ou	
	5	Indurés, présence d'un seul testicule (l'autre	1
		n'avant pas été retiré)	
	_		
ETAT DE VIGILANCE	1	Normal	
	4	Normal mais quelques absences ou syncopes	7
	5	Somnolence, apathle permanente	3 1
PROPRIOCEPTION ET USURE DES		Présente, pas d'usure	3 1
GRIFFES	2	Diminuée, usure modénée	
	۳	Absente, usure importante	3 1
CONTINENCE FECALE	1	Conservée	
	4	Déficit intermittent	_
	5	Déficit permanent	_
ORIENTATION	1	Aucun symptôme	
(se perd, regarde dans le vide, fait les			_
100 pas, se coincedans des endroits	4	1 ou 2 symptômes	1
trop-étroits)	_		
	5	3 ou 4 symptômes	
	_		_
REACTIVITE	1	Normale	
(aux autres animaux, aux odeum, aux personnes, aux bruits, aux			1
changements d'horaine, à l'annivée d'un	3	Moyenne	1
ieune animali			1
,	-	Indifférence totale	-
	- >	indmerence totale	
ANXIETE	1	Absence	_
(troubles du sommel, vocalisations,	-		
destructions)	4	Intermittente	1
20000000	-	Darmanunte	_

Animal SALLY

APPETIT

QUALITE ET DENSITE DE PELAGE

ERUITS SURAJOUTES

CONSISTANCE FECALE

ASPECT TESTICULAIRE

NIVEAU D'ACTIVITE	1	Normal		
(initiatives pour sorties, jeux, caresses; activité dehors ou dedans, en laisse ou libre)	3	Moyen	Ī	
	5	Falble	_	
			Ξ	
APPRENTISSAGE	:	Non modifié		
ordiner, comportement de tollette, propretié, reconnaissance de personnes familières (4	Réponse aléatoire		
	5	Perte totale	Т	
			_	
AGRESSIVITE	1	Absence d'agressivité		
	2	Mord en ayant grogné auparavant, se soumet		
		Morrisons menare nesalt rius se soumettre	_	

		5	Métastases à distance ou processus d'emblée généralisé	I
SCORE D'EVALUATION				
	Note ≤ 60	Vells	sement normal	1
41	Note comprise	Veille	sement nathologique débutant	1